

**ANESTHESIE POUR
ARTHROPLASTIE DE LA
HANCHE AU CHU MERE-ENFANT
LE LUXEMBOURG DE BAMAKO**

**MEUZEBOU A, COULIBALY M, COULIBALY B, DABO A, KOITA S, TRAORE S,
TOURE MK, DIALLO B, DOUMBOUYA B, BAH A, DJIRE I, TRAORE L**

PLAN

- INTRODUCTION
- OBJECTIFS
- METHODOLOGIE
- RESULTATS
- CONCLUSION

INTRODUCTION

La chirurgie pour arthroplastie de la hanche est l'exemple type de la chirurgie fonctionnelle.

C'est une intervention dont la mortalité loin d'être négligeable, implique une gestion rigoureuse des différents risques encourus : anesthésiques, hémorragiques, infectieux et thromboemboliques.

OBJECTIFS

Rapporter notre expérience quant à la prise en charge anesthésique péri-opératoire des patients opérés pour une prothèse de hanche

METHODOLOGIE

Type d'étude: Etude retrospective

Période d'étude: Septembre 2018- Septembre 2019.

Inclus: Tous les patients pris au bloc opératoire pour arthroplastie de la hanche

RESULTATS (1/4)

- 57 patients opérés pour arthroplastie de hanche
- L'âge moyen: 51,8ans avec extrêmes de 19 et 91ans
- Le sex-ratio: 1,3

RESULTATS (2/4)

- 54,4% des patients ont été classé ASA II.
- Diagnostic préopératoire: Coxarthrose (52,6%)
- PTH réalisée dans 93% des cas
- Antibioprophylaxie: Céfuroxime (57,9%)
- L'acide tranexamique chez 93% des patients

RESULTATS (3/4)

- La rachianesthésie (Bupivacaine + morphine) : 84,2%
- Incident peropératoire: Hypotension artérielle (59,6%).
- Les pertes sanguines moyennes :580ml.
- Durée moyenne: 152min.

RESULTATS (4/4)

- Protocole analgésique postopératoire:
Paracétamol+néfopam+AINS (80,7%)
- EVA 3 (59,6%)
- 07 cas de complications postopératoires :
 - 02 infections
 - 03 luxations
 - 01 hématome postopératoire
 - 01 reprise de PTH pour traumatisme postopératoire

CONCLUSION

- L'arthroplastie totale de la hanche est devenue une pratique courante est bien codifiée en chirurgie orthopédique

MERCI POUR VOTRE ATTENTION