L'anesthésie sur terrain difficile (Hôpital isolé, bloc opératoire peu ou pas équipé, ressources humaines insuffisantes)

Gilbert Fabrice OTIOBANDA, Maître de Conférences Agrégé
Faculté des Sciences de la Santé ; Université Marien Ngouabi

Introduction (1)

- ❑ Anesthésie: progrès important (recherche, technique et ressources humaines et matérielles)
- ❑ Sécurité des patients: maximale

Réalité dans les pays développés

Introduction (2)

- Pays en voie de développement:
 - pas d'installation adéquate;
 - manque en matériel et consommables;
 - manque d'oxygène;
 - déficits en personnels qualifiés.

Introduction (3)

- Que faire pour mettre nos patients en sécurité?
 - Bilan du patient avant l'anesthésie: état du patient et intervention;
 - Choix des techniques et des médicaments sûrs;
 - Surveillance rigoureuse des fonctions vitales;
 - Appeler à l'aide en cas de doute.

Bilan du patient avant anesthésie(1)

- ❑ Absence de bilan: cause fréquente d'accidents en anesthésie
 - Pour tout patient;
 - Pas de « petite anesthésie »
 - Réalisé par la personne qui réalise l'anesthésie;
 - Anamnèse complète: type d'intervention, anesthésie antérieure, pathologies chroniques, traitement chronique, allergie;
 - Examen clinique: signes généraux, voies aériennes, tous les appareils...

Bilan du patient avant anesthésie(2)

- Après ce bilan, trois questions à se poser:
 - Traitement pré opératoire?
 - Transfère du patient?
 - Quelle d'anesthésie?

Technique d'anesthésie et des médicaments (1)

- Anesthésie générale
 - Technique intraveineuse avec conservation de la ventilation spontanée; voie IM possible mais délai d'action long
 - Kétamine: produit idéal
 - anesthésie dissociative
 - conservation des reflexes pharyngés et laryngés

- Inconvénients: élévation de la pression oculaire et intracrânienne, pas de relâchement musculaire, agitation au réveil, hypersécrétion salivaire

Technique d'anesthésie et des médicaments (2)

Anesthésie générale

- Dose: 2 à 6 mg/kg, 6 à 10 mg/kg si IM, césarienne < 2 mg/kg;
- Injecter lentement;
- Disposer d'une benzodiazépine et de l'atropine

Précautions

- Patient à jeun;
- Table inclinable;
- Aspirateur à portée de main

Technique d'anesthésie et des médicaments (3)

□ Indications de la kétamine

- Interventions courtes: réduction d'une fracture, pansement de brûlé;
- Anesthésie sur la tête et le cou, lorsque l'anesthésie locale n'est pas souhaitable;
- Interventions portant sur plusieurs parties du corps;
- Interventions urgentes si AG+IOT eu RA non possibles;
- Interventions sur les membres, biopsies;
- Induction du patient en état de choc

Technique d'anesthésie et des médicaments (3)

□ Anesthésie de conduction

- Emploi des substances qui agissent localement et bloquent les impulsions:
anesthésiques locaux;
- Locales: infiltrations d'anesthésiques
- Lidocaïne 1 ou 2%:
 - Dose: 1 à 2 mg/kg, max 4mg/kg
 - Toxicité: atteinte du SNC

Technique d'anesthésie et des médicaments (3)

- Anesthésie de conduction
 - Régionale: rachianesthésie
 - Simple
 - Fiable
 - Efficace
 - Moindre cout

Technique d'anesthésie et des médicaments (3)

☐ Anesthésie de conduction

- Bupivacaïne 0,5% hyperbare ou isobare
- Dose: 7,5 à 10 mg
- Effets secondaires: hypotension artérielle, bradycardie, rachianesthésie totale
- Surveillance: PA, FC +++
- Vasoconstricteurs ++++ (Ephédrine)

Technique d'anesthésie et des médicaments (3)

□ Anesthésie de conduction

- Indications: chirurgie sous ombilicale
- Contre indication:
 - Allergies aux AL
 - Refus du patient
 - Infection au voisinage du site de ponction et sepsis
 - Hypovolémie non compensée
 -

Surveillance des fonctions vitales (1)

☐ Fonction respiratoire

- AG: dépression de la fonction respiratoire → Surveillance +++
- Modification coloration et mouvements thoraciques
- Couleur du sang au niveau de la plaie opératoire
- **Oxymètre de pouls**: intérêt capital, bon reflet de l'oxygénation tissulaire

Surveillance des fonctions vitales (1)

☐ Fonction cardiovasculaire

- Fréquence cardiaque: toutes les 5 à 10 min
- Doigt au niveau d'une artère superficielle
- Auscultation précordiale

- Pression artérielle: toutes les 5 à 10 min
- Tensiomètre manuelle
- $PAD = PAS/2 + 1$

Surveillance des fonctions vitales (1)

☐ Fonction cardiovasculaire

- Circulation périphérique: difficile d'évaluer directement
- Coloration et température des mains et des pieds
- Diurèse: 0,5 à 1 ml/kg/h (reflet indirect du débit cardiaque)

☐ Fonction neurologique

- Difficile si AG
- Garder le contact verbale si AL ou AG

APPEL A L'AIDE

- Etre minimum à deux
 - L'anesthésie ne se fait seule surtout en zone « reculée »
 - Il n'y a pas de **petite anesthésie**
-
- Avoir un **réfèrent** plus **expérimenté** pour demander conseil
-
- Minimum nécessaire: ballon auto gonflable, matériel d'intubation, Tensiomètre, stéthoscope, aspirateur, Médicaments d'urgence,

Conclusion (1)

1. Examiner et préparer correctement le patient
2. Laisser le patient à jeun
3. Pratiquez l'anesthésie sur une table inclinable
4. Vérifiez vos médicaments et votre matériel avant de commencer
5. Ayez toujours un aspirateur prêt.

Conclusion (2)

6. Préservez la liberté des voies aériennes
 7. Soyez prêt à contrôler la ventilation de votre patient
 8. Prenez une voie veineuse
 9. Surveillez le pouls et la pression artérielle
 10. Ayez toujours quelqu'un pour vous aider.
-