

PRISE EN CHARGE DES ENVENIMATIONS PAR VENIN NEUROTROPE AU SERVICE DE REANIMATION DU CHU DE BOUAKE: A PROPOS DE 9 CAS

N'DA-KOFFI NHC, PETE Y, KOFFI N, IRIE BI, OGONDON B, KOUADIO S,
KOUAME KE, BROUH Y.

INTRODUCTION

- ❖ Les envenimations par morsure de serpent classées au 1er rang des maladies tropicales négligées
- ❖ Sd cobraïque : Peu fréquent [Chippaux JP med trop 2007]
- ❖  tableau neurologique potentiellement fatal
- ❖ la mort en quelques heures par paralysie respiratoire
- ❖ Urgence thérapeutique

METHODOLOGIE

- ❖ Rétrospective à visée descriptive
- ❖ Janvier 2017 à Juin 2017 réanimation polyvalente CHU Bouaké
- ❖ Tous les patients admis pour envenimation à venin neurotoxique
- ❖ Paramètres étudiés : épidémiologique, Clinique, thérapeutique et évolutif

RESULTATS ET COMMENTAIRES


❖ 9 cas

❖ Age moyen : 44,12 ans; extrêmes de 12 -80ans


❖ Profession : cultivateurs (92,7%)

❖ Envenimation grade III chez tous les patients


RESULTATS ET COMMENTAIRES: SIGNES FONCTIONNELS




RESULTATS ET COMMENTAIRES: TRAITEMENT PREHOSPITALIER




RESULTATS ET COMMENTAIRES: SIGNES PHYSIQUES



RESULTATS ET COMMENTAIRES: TRAITEMENT



Evolution



CONCLUSION

- ❖ Affection grave mortel
- ❖ Prévention
- ❖ Disponibilité en antivenin